УДК 517.5

В.Ф. Бабенко^{*,**}, Д.А. Левченко^{*}^{*}Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,^{**}Институт прикладной математики и механики НАН Украины**НЕРАВЕНСТВА ТИПА КОЛМОГОРОВА ДЛЯ ГИПЕРСИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛОВ СО ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ**

Доведені нові точні нерівності типу Колмогорова для гіперсингулярного інтеграла з однорідною характеристикою вигляду $\Omega(t) = \operatorname{sgn} \prod_{k=1}^m t_k$ функцій багатьох змінних з простору Гьольдера.

Ключові слова: гіперсингулярний інтеграл, однорідна характеристика, модуль неперервності.

Доказаны новые точные неравенства типа Колмогорова для гиперсингулярного интеграла с однородной характеристикой вида $\Omega(t) = \operatorname{sgn} \prod_{k=1}^m t_k$ функций многих переменных из пространства Гельдера.

Ключевые слова: гиперсингулярный интеграл, однородная характеристика, модуль непрерывности.

New sharp Kolmogorov type inequalities for hypersingular integrals with homogeneous characteristic in form $\Omega(t) = \operatorname{sgn} \prod_{k=1}^m t_k$ for multivariate functions from Hölder spaces are obtained.

Key words: hypersingular integral, homogeneous characteristic, module of continuous.

Неравенства для норм промежуточных производных функций одной переменной важны для многих областей математики (математический анализ, теория аппроксимации, обыкновенные дифференциальные уравнения, теория некорректных задач, теория оптимальных алгоритмов и др.). К настоящему времени известно значительное количество точных неравенств типа Колмогорова для функций одной переменной. С соответствующими результатами можно ознакомиться, например, по [3; 1]. Случай функций многих переменных изучен в значительно меньшей степени. По поводу известных точных неравенств типа Колмогорова сошлемся на работы [2; 5; 7; 9; 11].

В ряде вопросов математического анализа и его приложений возникает потребность наряду с производными и интегралами целых порядков рассматривать также производные и интегралы дробных порядков. Следует отметить, что точное решение экстремальных задач анализа и, в частности, теории аппроксимации, связанных с дробными производными и интегралами, встречаются со значительными трудностями. По этой причине известно совсем немного точных неравенств типа Колмогорова для дробных производных функций одной и многих переменных [4; 6; 10; 12]. Ряд точных

неравенств для дробных производных функций одной и многих переменных получен только в последнее время.

Во многих случаях дробные степени дифференциальных операторов реализуются в виде сингулярных интегралов. Данная работа посвящена получению некоторых точных неравенств типа Колмогорова для гиперсингулярных интегралов со знакопеременной характеристикой.

Через $C(R^n)$ обозначим пространство всех непрерывных ограниченных функций $f: R^n \rightarrow R$ с нормой

$$\|f\|_C := \sup \{ |f(u)| : u \in R^n \}.$$

Для заданного модуля непрерывности $\omega(t)$ через $H^\omega(R^n)$ обозначим пространство функций $f \in C(R^n)$, для которых

$$\|f\|_{H^\omega} := \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{\omega(|x - y|)} < \infty,$$

где для $u \in R^n$

$$|u| = \sqrt{u_1^2 + \dots + u_n^2}.$$

В случае, когда $\omega(t) = t^\beta$, $\beta \in (0, 1]$, то вместо $H^\omega(R^n)$ будем писать $H^\beta(R^n)$.

Если $\omega(t)$ модуль непрерывности, для которого

$$\int_0^1 \frac{\omega(t)}{t^{1+\alpha}} dt < \infty, \quad (1)$$

то для любого $h > 0$ определим величину

$$I_{\omega, \alpha}(h) := \int_0^h \frac{\omega(t)}{t^{1+\alpha}} dt.$$

Дробная производная Рисса порядка $\alpha \in (0, 1)$ функций $f: R^n \rightarrow R$ определяется [8] так

$$(D^\alpha f)(u) := \frac{1}{d_{n,1}(\alpha)} \int_{R^n} \frac{f(u) - f(u-t)}{|t|^{n+\alpha}} dt, \quad (2)$$

где

$$d_{n,1}(\alpha) = \frac{\pi^{1+\frac{n}{2}}}{2^\alpha \Gamma\left(1+\frac{\alpha}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n+\alpha}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha\pi}{2}\right)}.$$

Отметим [8], что производная Рисса реализует дробную степень оператора Лапласа

$$D^\alpha f = (-\Delta)^{\frac{\alpha}{2}} f,$$

где

$$\Delta f = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial u_k^2}.$$

Будем рассматривать более общую чем (2) конструкцию вида [8]

$$(D_\Omega^\alpha f)(u) := \frac{1}{d_{n,1}(\alpha)} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(u) - f(u-t)}{|t|^{n+\alpha}} \Omega(t') dt, \quad (3)$$

где функция $\Omega(t')$ ($t' = t/|t|$) не зависит от f и называется однородной характеристикой.

В [12] доказаны следующие точные неравенства типа Колмогорова для гиперсингулярного интеграла порядка α ($0 < \alpha \leq 1$) с однородной характеристикой, в случае когда Ω неотрицательна и интегрируема на единичной сфере $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ для любой функции $f \in H^\omega(\mathbb{R}^n)$ и $h > 0$:

$$\|D_\Omega^\alpha f\|_C \leq \frac{1}{d_{n,1}(\alpha)} \int_{S^{n-1}} \Omega(t') dt' \left(I_{\omega,\alpha}(h) \|f\|_{H^\omega} + \frac{2\|f\|_C}{\alpha h^\alpha} \right), \quad (4)$$

$$\|D_\Omega^\alpha f\|_C \leq \frac{2^{\frac{1-\alpha}{\beta}} \beta}{\alpha(\beta-\alpha) d_{n,1}(\alpha)} \int_{S^{n-1}} \Omega(t') dt' \|f\|_C^{1-\frac{\alpha}{\beta}} \|f\|_{H^\beta}^{\frac{\alpha}{\beta}}.$$

Минимизируя по h правую часть неравенства (4), нетрудно получить следующее неравенство

$$\|D_\Omega^\alpha f\|_C \leq \frac{1}{d_{n,1}(\alpha)} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\min\{2\|f\|_C; \|f\|_{H^\omega} \omega(|t|)\}}{|t|^{n+\alpha}} \Omega(t') dt.$$

В данной работе будем рассматривать гиперсингулярный интеграл (3) с характеристикой $\Omega(t) = \text{sgn} \prod_{k=1}^m t_k$, $1 \leq m \leq n$.

Для вектора $t = (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n$ обозначим через $\Delta_{t, e_i} f(u)$ разность функции $f(u)$ по переменной u_i с шагом t_i

$$\Delta_{t, e_i} f(u) = f(u + t_i e_i) - f(u - t_i e_i)$$

где $\{e_1, \dots, e_n\}$ — стандартный базис в $\mathbb{R}^n$. Пусть

$$\Delta_t^m f(u) = \Delta_{t_1 e_1} \circ \dots \circ \Delta_{t_m e_m} f(u) -$$

смешанная разность функции $f(u)$ с шагом t по первым m переменным. Несложно показать, что

$$(D_\Omega^\alpha f)(u) = \frac{1}{d_{n,1}(\alpha)} \int_{R^{n-m}} \left(\int_{R_+^m} \frac{\Delta_t^m f(u + \tilde{t}^{n-m})}{|t|^{n+\alpha}} dt^m \right) d\tilde{t}^{n-m}, \quad (5)$$

где $t = (t^m, \tilde{t}^{n-m})$,

$$t^m = \sum_{i=1}^m t_i e_i, \quad \tilde{t}^{n-m} = \sum_{i=m+1}^n t_i e_i, \quad dt^m = dt_1 \dots dt_m, \quad d\tilde{t}^{n-m} = dt_{m+1} \dots dt_n,$$

$$R_+^m = \{t \in R^m: t_i \geq 0, i=1, \dots, m\}$$

Рассмотрим задачу о точной оценке $\|D_\Omega^\alpha f\|_C$ для функций $f \in H^\omega(R^n)$. Нами доказана

Теорема. Пусть $\alpha \in (0,1)$ и выпуклый вверх модуль непрерывности $\omega(t)$ таковы, что выполнено условие (1). Тогда для любой функции $f \in H^\omega(R^n)$ и $h > 0$ имеют место точные неравенства:

$$\|D_\Omega^\alpha f\|_C \leq \frac{2^{n-1}}{d_{n,1}(\alpha)} \int \frac{\min \left\{ 2\|f\|_C; \|f\|_{H^\omega} \omega \left(2 \min_{1 \leq i \leq m} \{t_i\} \right) \right\}}{|t|^{n+\alpha}} dt, \quad (6)$$

$$\|D_\Omega^\alpha f\|_C \leq \frac{\alpha 2^{n-1}}{d_{n,1}(\alpha)} B_m^n \left(2^{\alpha} I_{\omega, \alpha}(2h) \|f\|_{H^\omega} + \frac{2\|f\|_C}{\alpha h^\alpha} \right), \quad (7)$$

где

$$B_m^n = \underbrace{\int_0^\infty \dots \int_0^\infty}_{n-m} \left(\underbrace{\int_1^\infty \dots \int_1^\infty}_m \frac{du^m}{|u|^{n+\alpha}} \right) d\tilde{u}^{n-m}.$$

Функция

$$f_h(t) = \frac{1}{2} \Omega(t') \omega(2 \min \{h, |t_1|, \dots, |t_m|\})$$

Является экстремальной для неравенств (6) и (7).

Доказательство. Из представления (5) очевидным образом получается

$$|(D_\Omega^\alpha f)(u)| = \frac{1}{d_{n,1}(\alpha)} \int_{R^{n-m}} \left(\int_{R_+^m} \frac{|\Delta_t^m f(u + \tilde{t}^{n-m})|}{|t|^{n+\alpha}} dt^m \right) d\tilde{t}^{n-m}. \quad (8)$$

Для оценки $|\Delta_t^m f(u + \tilde{t}^{n-m})|$ будем использовать следующие неравенства:

$$|\Delta_t^m f(u + \tilde{t}^{n-m})| \leq 2^m \|f\|_C,$$

$$|\Delta_t^m f(u + \tilde{t}^{n-m})| \leq 2^{m-1} \omega(2|t_i|) \|f\|_{H^0}, \quad i=1, \dots, m.$$

Объединяя эти оценки, получим

$$|\Delta_t^m f(u + \tilde{t}^{n-m})| \leq 2^{m-1} \min \left\{ 2\|f\|_C; \|f\|_{H^0} \omega \left(2 \min_{1 \leq i \leq m} \{t_i\} \right) \right\}.$$

Отсюда и из (8) получаем следующее неравенство

$$|(D_\Omega^\alpha f)(u)| \leq \frac{2^{n-1}}{d_{n,1}(\alpha)} \int_{R_+^n} \frac{\min \left\{ 2\|f\|_C; \|f\|_{H^0} \omega \left(2 \min_{1 \leq i \leq m} \{t_i\} \right) \right\}}{|t|^{n+\alpha}} dt. \quad (9)$$

Покажем, что для любой функции $f \in H^0(R^n)$ ее гиперсингулярный интеграл непрерывно зависит от u .

Пусть

$$\omega(f, \theta) := \sup_{|u| \leq \theta} \|f(\cdot) - f(\cdot + u)\|_C.$$

Применяя неравенство (9) к разности $f(u) - f(u + \delta)$, $\delta \in R^n$, получаем

$$|(D_\Omega^\alpha f)(u) - (D_\Omega^\alpha f)(u + \delta)| \leq \frac{2^{n-1}}{d_{n,1}(\alpha)} \int_{R_+^n} \frac{\min \left\{ 2\omega(f, |\delta|); \|f\|_{H^0} \omega \left(2 \min_{1 \leq i \leq m} \{t_i\} \right) \right\}}{|t|^{n+\alpha}} dt.$$

Отметим, что семейство функций

$$\frac{\min \left\{ 2\omega(f, |\delta|); \|f\|_{H^0} \omega \left(2 \min_{1 \leq i \leq m} \{t_i\} \right) \right\}}{|t|^{n+\alpha}}$$

равномерно стремится к нулю на любом множестве векторов t таких, что $t_i \in [\sigma_i, \infty)$ ($\sigma_i > 0$, $i=1, \dots, m$; $\sigma_i \geq 0$, $i=m+1, \dots, n$), и интеграл

$$\int_{R_+^n} \frac{\min \left\{ 2\omega(f, |\delta|); \|f\|_{H^0} \omega \left(2 \min_{1 \leq i \leq m} \{t_i\} \right) \right\}}{|t|^{n+\alpha}} dt$$

равномерно сходится.

Следовательно,

$$\left| (D_{\Omega}^{\alpha} f)(u) - (D_{\Omega}^{\alpha} f)(u + \delta) \right| \rightarrow 0, \quad |\delta| \rightarrow 0,$$

что и доказывает непрерывность $(D_{\Omega}^{\alpha} f)(u)$ для всех $u \in \mathbb{R}^n$. Тогда в силу произвольности $u \in \mathbb{R}^n$, получаем (6).

Далее, обозначим через I интеграл

$$I = \int_{\mathbb{R}_+^n} \frac{\min \left\{ 2\|f\|_C; \|f\|_{H^{\alpha}} \omega \left(2 \min_{1 \leq i \leq m} \{t_i\} \right) \right\}}{|t|^{n+\alpha}} dt.$$

Разобьем пространство $\mathbb{R}_+^n$ множествами ($h > 0$)

$$A_0 = \{t \in \mathbb{R}_+^n: \min\{h, t_1, \dots, t_m\} = h\},$$

$$A_j = \{t \in \mathbb{R}_+^n: \min\{h, t_1, \dots, t_m\} = t_j\}.$$

Так как $\mathbb{R}_+^n = \bigcup_{j=1}^m A_j$, то

$$I \leq 2\|f\|_C I_0 + \|f\|_{H^{\alpha}} \sum_{j=1}^m I_j,$$

где

$$I_0 = \int_{A_0} \frac{dt}{|t|^{n+\alpha}}, \quad I_j = \int_{A_j} \frac{\omega(2t_j)}{|t|^{n+\alpha}} dt.$$

Ясно, что

$$I_0 = \int_0^{\infty} \dots \int_0^{\infty} \left(\int_h^{\infty} \dots \int_h^{\infty} \frac{du^m}{|u|^{n+\alpha}} \right) d\tilde{u}^{n-m} = \frac{1}{h^{\alpha}} \int_0^{\infty} \dots \int_0^{\infty} \left(\int_1^{\infty} \dots \int_1^{\infty} \frac{dt^m}{|t|^{n+\alpha}} \right) d\tilde{t}^{n-m} = \frac{1}{h^{\alpha}} B_m^n.$$

Интегралы I_j вычисляются одинаково. Вычислим, например, I_m

$$\begin{aligned} I_m &= \int_0^{\infty} \dots \int_0^{\infty} \left[\int_0^h \omega(2u_m) \left(\int_{u_m}^{\infty} \dots \int_{u_m}^{\infty} \frac{du^{m-1}}{|u|^{n+\alpha}} \right) du_m \right] d\tilde{u}^{n-m} = \\ &= \int_0^h \frac{\omega(2y)}{y^{1+\alpha}} dy \int_0^{\infty} \dots \int_0^{\infty} \left(\int_1^{\infty} \dots \int_1^{\infty} \frac{dt^{m-1}}{(1+t_1^2 + \dots + t_{n-1}^2)^{\frac{n+\alpha}{2}}} \right) d\tilde{t}^{(n-1)-(m-1)} = \end{aligned}$$

$$= 2^\alpha I_{\omega, \alpha}(2h) \underbrace{\int_0^\infty \dots \int_0^\infty}_{n-m} \left(\underbrace{\int_1^\infty \dots \int_1^\infty}_{m-1} \frac{dt^{m-1}}{(1+t_1^2 + \dots + t_{n-1}^2)^{\frac{n+\alpha}{2}}} \right) d\tilde{t}^{(n-1)-(m-1)} = \frac{2^\alpha I_{\omega, \alpha}(2h)}{m} B_m^n,$$

где $d\tilde{t}^{(n-1)-(m-1)} = dt_m \dots dt_{n-1}$. Поясним последнее равенство.

$$\begin{aligned} B_m^n &= \underbrace{\int_0^\infty \dots \int_0^\infty}_{n-m} \left(\underbrace{\int_1^\infty \dots \int_1^\infty}_m \frac{du^m}{|u|^{n+\alpha}} \right) d\tilde{u}^{n-m} = \underbrace{\int_0^\infty \dots \int_0^\infty}_{n-m} \left(\sum_{k=1}^m \underbrace{\int_{u_k}^\infty \dots \int_{u_k}^\infty}_{m-1} \frac{(du^m)^*}{|u|^{n+\alpha}} \right) du_k d\tilde{u}^{n-m} = \\ &= \underbrace{\int_0^\infty \dots \int_0^\infty}_{n-m} \left(m \int_1^\infty \left(\underbrace{\int_{u_m}^\infty \dots \int_{u_m}^\infty}_{m-1} \frac{du^{m-1}}{|u|^{n+\alpha}} \right) du_m \right) d\tilde{u}^{n-m} = m \int_1^\infty \frac{dy}{y^{1+\alpha}} \underbrace{\int_0^\infty \dots \int_0^\infty}_{n-m} \left(\underbrace{\int_1^\infty \dots \int_1^\infty}_{m-1} \frac{dt^{m-1}}{(1+t_1^2 + \dots + t_{n-1}^2)^{\frac{n+\alpha}{2}}} \right) d\tilde{t}^{(n-1)-(m-1)} \\ &= \frac{m}{\alpha} \underbrace{\int_0^\infty \dots \int_0^\infty}_{n-m} \left(\underbrace{\int_1^\infty \dots \int_1^\infty}_{m-1} \frac{dt^{m-1}}{(1+t_1^2 + \dots + t_{n-1}^2)^{\frac{n+\alpha}{2}}} \right) d\tilde{t}^{(n-1)-(m-1)}, \end{aligned}$$

откуда

$$\underbrace{\int_0^\infty \dots \int_0^\infty}_{n-m} \left(\underbrace{\int_1^\infty \dots \int_1^\infty}_{m-1} \frac{dt^{m-1}}{(1+t_1^2 + \dots + t_{n-1}^2)^{\frac{n+\alpha}{2}}} \right) d\tilde{t}^{(n-1)-(m-1)} = \frac{\alpha}{m} B_m^n.$$

Выше через $(du^m)^*$ было обозначено

$$(du^m)^* = du_1 \dots du_{k-1} du_{k+1} \dots du_m.$$

Таким образом

$$I \leq \alpha B_m^n \left(2^\alpha I_{\omega, \alpha}(2h) \|f\|_{H^\omega} + \frac{2\|f\|_C}{\alpha h^\alpha} \right).$$

Из последней оценки и из (6) следует (7).

Теперь покажем, что функция $f_h(t)$ ($h > 0$) обращает (6) и (7) в равенства. Из определения $f_h(t)$ очевидно, что

$$\|f_h\|_C = \frac{\omega(2h)}{2}.$$

Покажем, что

$$\|f_h\|_{H^\omega} \leq 1.$$

Рассмотрим случай, когда для разных векторов $x, y \in R^n$ $\Omega(x')$ и $\Omega(y')$ одного знака. Пускай $|x_i| = \min\{|x_1|, \dots, |x_m|\}$ и $|y_j| = \min\{|y_1|, \dots, |y_m|\}$. Возможны следующие варианты (делая оценку сверху будем использовать полуаддитивность $\omega(t)$):

1) если $|y_j| \leq |x_i| \leq h$, то

$$\begin{aligned} |f_h(x) - f_h(y)| &= \frac{1}{2} |\omega(2|x_i|) - \omega(2|y_j|)| = \frac{1}{2} [\omega(2|x_i|) - \omega(2|y_j|)] \leq \frac{1}{2} [\omega(2|x_i|) - \omega(2|y_j|)] \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \omega(2|x_i| - 2|y_j|) \leq \frac{1}{2} \omega(2|x_i - y_j|) \leq \omega(|x_i - y_j|) \leq \omega(|x - y|); \end{aligned}$$

2) если $|x_i| \leq |y_j| \leq h$, то

$$\begin{aligned} |f_h(x) - f_h(y)| &= \frac{1}{2} |\omega(2|x_i|) - \omega(2|y_j|)| = \frac{1}{2} [\omega(2|y_j|) - \omega(2|x_i|)] \leq \frac{1}{2} [\omega(2|y_j|) - \omega(2|x_i|)] \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \omega(2|y_j| - 2|x_i|) \leq \frac{1}{2} \omega(2|x_i - y_j|) \leq \omega(|x_i - y_j|) \leq \omega(|x - y|); \end{aligned}$$

3) если $|y_j| \leq h \leq |x_i|$, то

$$\begin{aligned} |f_h(x) - f_h(y)| &= \frac{1}{2} |\omega(2h) - \omega(2|y_j|)| = \frac{1}{2} [\omega(2h) - \omega(2|y_j|)] \leq \frac{1}{2} [\omega(2|x_i|) - \omega(2|y_j|)] \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \omega(2|x_i| - 2|y_j|) \leq \frac{1}{2} \omega(2|x_i - y_j|) \leq \omega(|x_i - y_j|) \leq \omega(|x - y|); \end{aligned}$$

4) если $|x_i| \leq h \leq |y_j|$, то

$$\begin{aligned} |f_h(x) - f_h(y)| &= \frac{1}{2} |\omega(2|x_i|) - \omega(2h)| = \frac{1}{2} [\omega(2h) - \omega(2|x_i|)] \leq \frac{1}{2} [\omega(2|y_j|) - \omega(2|x_i|)] \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \omega(2|y_j| - 2|x_i|) \leq \frac{1}{2} \omega(2|x_i - y_j|) \leq \omega(|x_i - y_j|) \leq \omega(|x - y|); \end{aligned}$$

5) если $h \leq |x_i|, |y_j|$, то

$$|f_h(x) - f_h(y)| = \frac{1}{2} |\omega(2h) - \omega(2h)| = 0 \leq \omega(|x - y|).$$

Пусть теперь $\Omega(x')$ и $\Omega(y')$ разных знаков, тогда найдется индекс $1 \leq k_0 \leq m$ такой, что x_{k_0} и y_{k_0} будут иметь разные знаки, поэтому

$$|x_{k_0}| + |y_{k_0}| = |x_{k_0} - y_{k_0}|.$$

Используя выпуклость $\omega(t)$ будем иметь

$$|f_h(x) - f_h(y)| \leq \frac{1}{2} \left[\omega(2|x_{k_0}|) + \omega(2|y_{k_0}|) \right] \leq \omega(|x_{k_0}| + |y_{k_0}|) = \omega(|x_{k_0} - y_{k_0}|) \leq \omega(|x - y|).$$

Таким образом показано, что для любых $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$|f_h(x) - f_h(y)| \leq \omega(|x - y|)$$

или

$$\|f_h\|_{H^\omega} \leq 1.$$

Применим к $f_h(t)$ неравенство (7):

$$\|D_\Omega^\alpha f_h\|_C \leq \frac{\alpha 2^{n-1}}{d_{n,1}(\alpha)} B_m^n \left(2^\alpha I_{\omega, \alpha}(2h) + \frac{\omega(2h)}{\alpha h^\alpha} \right).$$

С другой стороны, используя определение (3) (отметим, что попарное пересечение множеств A_j ($j=0, \dots, m$) имеет нулевую меру Лебега)

$$\begin{aligned} \|D_\Omega^\alpha f_h\|_C &\geq |(D_\Omega^\alpha f_h)(0)| = \frac{2^{n-1}}{d_{n,1}(\alpha)} \int_{\mathbb{R}_+^n} \frac{\omega(2 \min_{1 \leq i \leq m} \{h, t_i\})}{|t|^{n+\alpha}} dt = \\ &= \frac{2^{n-1}}{d_{n,1}(\alpha)} \left(\omega(2h) I_0 + \sum_{j=1}^m I_j \right) = \frac{\alpha 2^{n-1}}{d_{n,1}(\alpha)} B_m^n \left(2^\alpha I_{\omega, \alpha}(2h) + \frac{\omega(2h)}{\alpha h^\alpha} \right) \end{aligned}$$

и точность неравенства (7) доказана. Точность (7) влечет точность (6). Теорема полностью доказана.

Если $\omega(t) = t^\beta$, тогда справедливо

Следствие. Пусть $0 < \alpha < \beta \leq 1$, тогда для любой функции $f \in H^\beta(\mathbb{R}^n)$ и $h > 0$ имеют место точные неравенства

$$\|D_\Omega^\alpha f\|_C \leq \frac{2^n}{h^\alpha d_{n,1}(\alpha)} B_m^n \left(\frac{\alpha 2^{\beta-1}}{\beta - \alpha} \|f\|_{H^\beta} + \|f\|_C \right), \quad (10)$$

$$\|D_\Omega^\alpha f\|_C \leq \frac{2^{n-(1-\beta)\frac{\alpha}{\beta}}}{d_{n,1}(\alpha)} \frac{\beta}{\beta - \alpha} B_m^n \|f\|_C^{1-\frac{\alpha}{\beta}} \|f\|_{H^\beta}^{\frac{\alpha}{\beta}} \quad (11)$$

с экстремальной функцией

$$f_h(t) = 2^{\beta-\alpha} \left(\min \{h, |t_1|, \dots, |t_m|\} \right)^\beta.$$

Доказательство. Отметим, что для $\omega(t) = t^\beta$

$$I_{\omega, \alpha}(2h) = \int_0^{2h} \frac{t^\beta}{t^{1+\alpha}} dt = \frac{2^{\beta-\alpha}}{\beta - \alpha} h^{\beta-\alpha}.$$

Из этого и из неравенства (7) немедленно следует (10), а положив в (10)

$$h=2^{\frac{1}{\beta}-1} \|f\|_C^{\frac{1}{\beta}} \|f\|_{H^\beta}^{\frac{1}{\beta}}$$

получим (11). Точность неравенств (10) и (11) проверяется аналогично тому, как это делалось в теореме выше. Следствие доказано.

Библиографические ссылки

1. **Арестов В.В.** Приближение неограниченных операторов ограниченными и родственные экстремальные задачи /В.В. Арестов// Усп. мат. наук. – 1996. – 51, № 6. – С.88–124.
2. **Бабенко В.Ф.** О точных неравенствах типа Колмогорова для функций двух переменных /В.Ф. Бабенко// Доп. НАН України. – 2000. – № 5. – С.7–11.
3. **Бабенко В.Ф.** Неравенства для производных и их приложения /В.Ф. Бабенко, Н.П. Корнейчук, В.А. Кофанов, С.А. Пичугов. 2003.
4. **Бабенко В.Ф.** Про нерівності типу Колмогорова для похідних дробового порядку/ В.Ф. Бабенко, М.С. Чурілова // Вісник Дніпропетровського університету. Математика, вип. 6, 2001, С.16–20.
5. **Буслаев А.П.** О неравенствах для производных в многомерном случае/ А.П. Буслаев, В.М. Тихомиров // Мат. заметки. –1979. – 25, №1. – С.59–74.
6. **Гейсберг С.П.** Обобщение неравенства Адамара /С.П. Гейсберг// Исследования по некоторым проблемам конструктивной теории функций: Сб. науч. тр. ЛОМИ. – Ленинград. –1965. – 50 – С.42–54.
7. **Коновалов В.Н.** Точные неравенства для норм функций, третьих частных и вторых смешанных производных /В.Н. Коновалов// Мат. заметки. –1978. – 23, № 1. – С.67–78.
8. **Самко С.Г.** Интегралы и производные дробного порядка и их приложения / С.Г. Самко, А.А. Килбас, О.И. Маричев – Минск, 1987, 304 с.
9. **Тимошин О.А.** Точные неравенства между нормами производных второго и третьего порядков /О.А. Тимошин// Докл. РАН. –1995. –344, № 1. – С.20–22.
10. **Arestov V.V.** Inequalities for fractional derivates on the half-line / V.V. Arestov// Approximation theory, Banach Center Publications. – 1979. – 4. – PWN, Warsaw. P. – 19–34.
11. **Babenko V.F.** Multivariate inequalities of Kolmogorov type and thier applications / V.F. Babenko, V.A. Kofanov, S.A. Pichugov, // Proc. of Manheim Conf. «Multivariate Approximation and Splines», 1996 / G. Nurnberger, J. Schmidt, G. Walz (eds.). – 1997. – P.1–12.
12. **Babenko V.F.** Kolmogorov type inequalities for hypersingular integrals with homogeneous characteristic/ V.F. Babenko, M.S. Churilova, // Banach Journal of Mathematics. - Vol. 1, № 1, p. 1–10.

Надійшла до редколегії 06.04.10